



Rovmider mod Spindemider 4

Spinde-rovmiderne leveres i en flaske med granulat (vermiculite) samt rovmider nok til at bekæmpe et begyndende angreb af spindemider.

Flasken med rovmiderne åbnes først ude i drivhuset eller udestuen. Flasken holdes vandret i hånden, og drejes forsigtigt så rovmiderne fordeles jævnt i granulatet. Drys små portioner ud på oversiden af bladene. Er der i starten for mange spindemider, kan planten sprøjtes med en insektsæbe på undersiden af bladene, eller de værst angrebne blade fjernes inden rovmiderne udsættes. Anvend nyttedyrene straks efter modtagelsen, eller opbevar dem max 2 dage i køleskab.

Følg bekæmpelsen hver 3. dag, ved at undersøge bladene på undersiden med en lup. Hvor der ses spindemider skal der også findes røde rovmider. Så vil rovmiderne efter 2-3 uger bekæmpe spindemiderne. Forveksel ikke den røde rovmide med vinterformen af spindemiden, der også kan være rød.

I varmt eller tørt klima kan rovmiderne hjælpes ved at overbruse planterne i løbet af dagen.

Bemærk at rovmiderne også er yderst anvendelige udendørs på jordbær, hindbær etc.



Spindemider Rovmider

Spindemider er små ca. 0,5 mm. lange mider, der primært sidder på undersiden af bladene på mange forskellige kulturplanter såsom agurk, peber, jordbær og mange potteplanter.

Væksthusspindemiden lægger små helt runde, klare æg på bladenes underside. Disse klækker efter få dage til larver/nymfer og senere til voksne spindemide. Den voksne udvikler 2 mørke pletter på ryggen. Til tider kan der også udvikles røde mider, der er overvintringsformer.

Miderne suger i bladcellerne, så der bliver små lyse pletter, der kan ses på oversiden af bladet. Når disse sug eller mider ses, udsættes rovmiderne så hurtigt som muligt.



Spinde-Rovmiden (*Phytoseiulus persimilis*), der stammer fra Sydamerika, har været anvendt i Europa med stor effekt i over 50 år. Æggene, der er cremede og ovale, lægges i spindemide kolonier, og i løbet af kort tid klækker der en lille larve.

Larverne udvikler sig til nymfer, der straks går igang med at spise spindemider.

Efter 2 nymfestadier udvikles den voksne rovmide.

Rovmiderne fungerer bedst ved høje luftfugtigheder (over 60% RH) (dette kan hjælpes med overbrusning af planterne) og ved temperaturer imellem 15-25°C.

